



URGENZE –EMERGENZE MATERNO FETALI

Docente: Monica Copelli

PREECLAMPSIA. ATTACCO ECLAMPTICO



- cefalea, disturbi visivi (interessamento del sistema nervoso centrale);
 - vomito e dolore epigastrico o dolore e tensione nel quadrante addominale superiore destro (interessamento del fegato);
 - iperreflessia o clonia o stato ingiustificato di agitazione psicomotoria.
- Altri segni che possono presentarsi in caso di aggravamento della pre-eclampsia sono:
- disturbi respiratori (affanno, dispnea) con riduzione della saturimetria periferica ($<96\%$) come segno di edema polmonare;
 - valori di pressione ≥ 180 mmHg di sistolica e/o ≥ 120 mmHg di diastolica per 30 minuti (controllata ogni 10-15 min) (emergenza ipertensiva);
 - valori di pressione ≥ 160 mmHg di sistolica e/o ≥ 110 mmHg di diastolica per 1 ora (controllata ogni 20 min) (urgenza ipertensiva);
 - alterazione degli esami ematici quali a) piastrine $<100.000/\text{mL}$; b) aumento degli enzimi epatici, in particolare le AST; c) aumento dell'LDH; d) aumento della creatinina oltre 1.2 mg/dL .

La valutazione iniziale comprende:

- a) l'anamnesi e raccolta delle informazioni;
- b) la ricerca di segni e sintomi;
- c) la misurazione della pressione arteriosa;
- d) la richiesta degli esami del sangue e delle urine;
- e) la valutazione dello stato fetale.



- a) emocromo;
- b) transaminasi;
- c) LDH;
- d) creatinina;
- e) proteinuria estemporanea (*dipstick*).



TERAPIA ANTIPERTENSIVA NELL'URGENZA/EMERGENZA

LABETALOLO (TRANDATE)

NIFEDIPINA (ADALAT)

PROFILASSI DELLE CONVULSIONI CON SOLFATO DI MAGNESIO

CARICO INIZIALE

MANTENIMENTO

Durante la somministrazione di Solfato di Magnesio è obbligatoria la sorveglianza con modalità semi-intensiva di alcuni parametri materni:

- Presenza del riflesso rotuleo
- Diuresi, per rilevare tempestivamente oliguria (meno di 100 ml in 4 ore)
- Frequenza degli atti respiratori, stabilire il ritmo di base prima dell'inizio dell'infusione



TABELLA 20.1**CORRELAZIONE TRA I LIVELLI EMATICI DI MgSO_4 E LA COMPARSA DI SEGNI E SINTOMI**

Sintomi e segni	Livelli MgSO_4 (mmol/l)
Sensazione di calore, sdoppiamento della vista, stordimento, difficoltà nel parlare	3.8–5.0
Assenza dei riflessi tendinei	> 7.0–8.0
Depressione respiratoria	> 8.0–10.0
Arresto Respiratorio	> 15.0–17.0
Arresto cardiaco	> 30.0



GESTIONE DELLA CRISI ECLAMPTICA

1. FASE ACUTA
2. STABILIZZAZIONE DELLA PAZIENTE
3. RISOLUZIONE DELLA GRAVIDANZA

